Nomb. Producto:	APRIL® - APRIL® 28	Presentación:	PROSPECTO
Cód. Interno:	32140-006	Pharmacode:	32140
Cód. EAN:			
Sustrato:	OBRA 56 - 60 g		
Tintas CMYK:			
Tintas Pantone:	1	Reflex blue C	
Barniz:	NO		
Troquel:	NO	Fto. Ab. 450 x 190 mm	Fto. Cerrado: 30 x 190 mm
Aprobación:	14/05/2022		

O.T. 3535

Classic Diseño & Fotografía

ESTA CARA A LA VISTA

32140

15 mm

10 mm

Gador

APRIL® - APRIL® 28
LEVONORGESTREL 0.10 mg
ETINILESTRADIOL 0.02 mg

Control médico recomendado
Industria argentina

Comprimidos recubiertos

COMPOSICIÓN
APRIL®
Cada comprimido recubierto contiene:
Levonorgestrel .... 0.10 mg
Etinilestradiol .... 0.02 mg
Excipientes .... c.s.
Contiene lactosa.

APRIL® 28
Cada comprimido recubierto anaranjado (activo) contiene:
Levonorgestrel .... 0.10 mg
Etinilestradiol .... 0.02 mg
Excipientes .... c.s.
Contiene lactosa.

Cada comprimido recubierto blanco (inactivo) contiene:
Excipientes .... c.s.
Contiene lactosa.

INDICACIONES
Anticoncepción oral.

POSOLOGÍA
Cómo iniciar la toma de APRIL® - APRIL® 28
- No ha utilizado un anticonceptivo hormonal previamente (en el mes anterior)
  La toma de los comprimidos comienza en el día 1 del ciclo natural de la mujer (= el primer día de su sangrado menstrual).
  Se permite comenzar en los días 2-5 pero, en ese caso, se recomienda utilizar un método de barrera adicional en los primeros 7 días del primer ciclo.
- Cambio de otro anticonceptivo oral combinado (AOC, anillo vaginal, parche transdérmico)
  El uso de los comprimidos de **APRIL® - APRIL® 28** comienza, preferiblemente, al día siguiente de tomar el último comprimido activo del AOC previo (o después de retirar el anillo o el parche), pero, como muy tarde, al día siguiente de una pausa habitual sin comprimidos (sin anillo o sin parche) o del último día de descanso o toma del comprimido inactivo blanco (caso APRIL® 28).
- Cambio a partir de un método que contiene sólo progestágeno (anticonceptivo oral, inyección, implante) o sistema intrauterino (SIU)
  La mujer puede cambiar a los comprimidos de **APRIL® - APRIL® 28** cualquier día de la toma del producto (en caso de un implante o de un SIU, el día de su extracción; y en caso de un dispositivo inyectable, en el momento en que correspondería la siguiente inyección) pero se aconsejaría en todos los casos usar otro método de barrera durante los primeros 7 días de la toma de los comprimidos.
- Después de un aborto en el primer trimestre
- Después de un parto o de un aborto en el segundo trimestre
  El uso de los comprimidos comienza entre 21 y 28 días después del parto o del aborto en el segundo trimestre. Cuando se comienza más tarde es necesario añadir un método de barrera durante los primeros 7 días de la toma de los comprimidos. Si la mujer ya ha mantenido relaciones sexuales, debe descartarse que se haya producido un embarazo antes de comenzar a usar de nuevo el AOC, o bien la mujer tiene que esperar a su siguiente periodo menstrual.
- Olvido de comprimidos

Las siguientes recomendaciones son aplicables en caso de olvido de comprimidos:
Los últimos 7 comprimidos blancos del envase de APRIL® 28 son comprimidos inactivos (no contienen principios activos). Por tanto, si se olvida uno de ellos no habrá consecuencias en el efecto del tratamiento. No obstante, el comprimido olvidado debe desecharse para que no se prolongue la fase de comprimidos inactivos.
APRIL® - APRIL® 28 contiene una dosis muy baja de ambas hormonas y, en consecuencia, el margen de eficacia anticonceptiva es pequeño si se olvida un comprimido activo.
La protección anticonceptiva no se reduce si han transcurrido menos de 12 horas desde que la mujer tenía que haber tomado un comprimido. En ese caso, deberá tomar el comprimido en cuanto se acuerde y seguirá tomando los comprimidos ulteriores a la hora habitual.
La protección anticonceptiva se reduce si han transcurrido más de 12 horas desde que la mujer tenía que haber tomado un comprimido. Las dos reglas básicas siguientes se aplican en caso de olvido de los comprimidos:
1. La toma de los comprimidos activos nunca debe interrumpirse durante más de 7 días.
2. La supresión del eje hipotálamo-hipófisis-ovario requiere 7 días de consumo ininterrumpido de los comprimidos.
Por tanto, para la práctica diaria puede darse el siguiente consejo:
Semana 1
La mujer debe tomar el último comprimido olvidado en cuanto se acuerde, aunque ello signifique que tenga que tomar dos comprimidos al mismo tiempo. Posteriormente continuará tomando los siguientes comprimidos a la hora habitual. Además, durante los 7 días siguientes deberá usar un método barrera, como un preservativo. Si la mujer ha mantenido relaciones sexuales en los 7 días anteriores al olvido, se debe considerar la posibilidad de un embarazo.
El riesgo de embarazo será mayor cuantos más comprimidos se hayan olvidado y más cerca estén de la fase de comprimidos inactivos.

32140

15 mm

10 mm

- Si tiene (o ha tenido) o si hay sospecha de cáncer de mama o cáncer en órganos genitales.
- Si tiene una hemorragia vaginal de causa desconocida.
- Si no tiene el periodo desde hace varios meses sin una causa conocida.
- Si es alérgica a levonorgestrel o etinilestradiol, o a cualquiera de los demás componentes de **APRIL® - APRIL® 28**. Esta alergia se puede reconocer por la aparición de prurito, erupción cutánea o inflamación.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar **APRIL® - APRIL® 28**.
En algunas situaciones, tendrá que tomar precauciones especiales cuando use **APRIL® - APRIL® 28** o cualquier otro anticonceptivo hormonal combinado, y a veces tendrá que acudir periódicamente a su médico. Si se encuentra en alguna de las situaciones siguientes, debe informar a su médico antes de comenzar a usar **APRIL® - APRIL® 28**. Además, tendrá que consultar con su médico si alguna de las siguientes situaciones aparece o empeora mientras usa **APRIL® - APRIL® 28**:
- Si un familiar cercano tiene o ha tenido cáncer de mama.
- Si tiene una enfermedad del hígado o de la vesícula biliar.
- Si sufre diabetes.
- Si tiene depresión.
- Si tiene enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa (enfermedad intestinal inflamatoria).
- Si tiene SUH (síndrome urémico hemolítico), un trastorno de la sangre que provoca daños renales.
- Si tiene anemia drepanocítica (una enfermedad hereditaria de los glóbulos rojos de la sangre).
- Si tiene epilepsia.
- Si tiene LES (lupus eritematoso sistémico, un trastorno del sistema inmunitario).
- Si tiene una enfermedad que haya aparecido por primera vez durante el embarazo o durante el uso previo de hormonas sexuales (p. ej., pérdida de audición, porfiria [una enfermedad de la sangre], herpes gestacional [una erupción cutánea con vesículas que aparece durante el embarazo], corea de Sydenham [una enfermedad de los nervios en la cual se producen movimientos bruscos del cuerpo]).
- Si tiene o ha tenido alguna vez cloasma (manchas pigmentadas de color marrón dorado que se conocen como "manchas del embarazo", en especial en la cara). Si así fuera, evite la exposición directa a la luz solar o a la luz ultravioleta.

Si experimenta síntomas de angioedema como hinchazón de la cara, lengua y/o garganta, y/o dificultad para tragar o urticaria con posible dificultad para respirar, contacte con un médico de forma inmediata. Los productos que contienen estrógenos pueden causar o empeorar los síntomas del angioedema hereditario y adquirido.
Trastornos psiquiátricos
Algunas mujeres que utilizan anticonceptivos hormonales como **APRIL® - APRIL® 28** han notificado depresión o un estado de ánimo deprimido. La depresión puede ser grave y a veces puede inducir pensamientos suicidas. Si experimenta alteraciones del estado de ánimo y síntomas depresivos, póngase en contacto con su médico para obtener asesoramiento médico adicional lo antes posible.
APRIL® - APRIL® 28 y trombosis
Trombosis venosa
El uso de cualquier anticonceptivo combinado, incluido **APRIL® - APRIL® 28**, aumenta el riesgo de la mujer de desarrollar una trombosis venosa (formación de un coágulo de sangre en un vaso) en comparación con una mujer que no tome ningún anticonceptivo.
El riesgo de trombosis venosa aumenta en las usuarias de anticonceptivos combinados:
- Con la edad.
- Si hay sobrepeso.
- Si alguno de sus familiares ha tenido un coágulo de sangre (trombosis) en la pierna, el pulmón u otro órgano a temprana edad.
- Si debe someterse a una operación (cirugía), un periodo de inmovilización prolongado o si ha sufrido un accidente grave. Es importante que comente con su médico que está usando **APRIL® - APRIL® 28**, ya que podría tener que interrumpir el tratamiento. Su médico le dirá cuando tiene que empezar a tomar **APRIL® - APRIL® 28** otra vez. Normalmente, será en un plazo de dos semanas tras su recuperación.

Trombosis arterial
El uso de anticonceptivos combinados se ha relacionado con el aumento del riesgo de trombosis arteriales (obstrucción de una arteria), por ejemplo, en los vasos sanguíneos del corazón (ataque cardíaco) o del cerebro (ictus).
El riesgo de trombosis arterial aumenta en las usuarias de anticonceptivos combinados:
- **Si fuma. Se le aconseja firmemente que deje de fumar cuando use APRIL® - APRIL® 28 en especial si es mayor de 35 años.**
- Si tiene sobrepeso.
- Si tiene concentraciones elevadas de grasa en su sangre (colesterol o triglicéridos).
- Si uno de sus familiares cercanos ha tenido un ataque cardíaco o un ictus a una edad temprana.
- Si tiene la presión arterial alta.
- Si tiene migrañas.
- Si tiene problemas de corazón (un trastorno valvular o una alteración del ritmo cardíaco).

Deje de tomar **APRIL® - APRIL® 28** y contacte inmediatamente con su médico si observa signos posibles de trombosis, como:
- Dolor intenso o hinchazón de una de sus piernas.
- Dolor intenso repentino en el pecho, que puede reflejarse hacia el brazo izquierdo.
- Falta de aire de aparición repentina.
- Tos repentina, sin una causa evidente.
- Un dolor de cabeza inusual, intenso o de larga duración, o empeoramiento de una migraña.
- Ceguera parcial o completa, o visión doble.
- Dificultad o imposibilidad para hablar.
- Vértigo o desvanecimiento.
- Debilidad, sensación extraña o entumecimiento en cualquier parte del cuerpo.

APRIL® - APRIL® 28 y cáncer
Se han observado casos de cáncer de mama con una frecuencia ligeramente mayor en mujeres que toman anticonceptivos orales, pero se desconoce si se debe al tratamiento. Por ejemplo, pudiera ser que se detectasen más tumores en mujeres que toman anticonceptivos combinados porque son revisadas por su médico con mayor frecuencia. La aparición de tumores de mama ha sido gradualmente menor después de interrumpir el uso de los anticonceptivos hormonales combinados. Es importante revisar periódicamente sus mamas, y deberá contactar con su médico si notara algún bulto.

En casos raros, se han descrito tumores benignos de hígado y casos aún más raros de tumores malignos de hígado en las usuarias de anticonceptivos. Contacte con su médico si nota un dolor abdominal intenso inusual.
Sangrado entre los periodos
Durante los primeros meses de tratamiento con **APRIL® - APRIL® 28** puede tener hemorragias inesperadas. Si esta hemorragia dura más de unos meses, o si comienza después de algunos meses, su médico debe investigar la causa.
Qué debe hacer si no hay sangrado en la semana de la toma de los comprimidos inactivos
Si ha tomado correctamente todos los comprimidos activos de color naranja, no ha vomitado ni ha tenido diarrea intensa y no ha tomado otros medicamentos, es muy improbable que esté embarazada.
Si la hemorragia esperada no aparece en dos ocasiones sucesivas, podría estar embarazada. Contacte inmediatamente con su médico. No comience a tomar el siguiente blíster hasta que esté segura de que no está embarazada.
Toma de APRIL® - APRIL® 28 con otros medicamentos
Consulte siempre con el médico que le ha prescrito **APRIL® - APRIL® 28** sobre otros medicamentos o hierbas medicinales que ya esté utilizando. Además, comente con cualquier otro médico o dentista que le prescriba otros medicamentos (o con el farmacéutico que los dispense) que está usando **APRIL® - APRIL® 28**. Le podrán decir si necesita añadir otras medidas anticonceptivas (p. ej., condones) y, en ese caso, durante cuánto tiempo.
Algunos medicamentos disminuyen la eficacia de **APRIL® - APRIL® 28** en la prevención del embarazo, o pueden provocar una hemorragia inesperada.
Entre ellos, se pueden citar los medicamentos usados para el tratamiento de la epilepsia (p. ej., primidona, fenitoína, barbitúricos, carbamazepina u oxcarbamazepina) y tuberculosis (p. ej., rifampicina) o infecciones por el VIH (ritonavir) u otras enfermedades infecciosas (como griseofulvina, ampicilina o tetraciclina), que aumenten la motilidad intestinal (como metoclopramida) y la planta medicinal hierba de San Juan. Si desea usar hierbas medicinales que contengan hipérico mientras tome **APRIL® - APRIL® 28**, debe consultar primero a su médico.
APRIL® - APRIL® 28 disminuye la eficacia de otros medicamentos, como los que contienen ciclosporina, o el antiepiléptico lamotrigina (por lo que podría aumentar la frecuencia de las convulsiones).
No tome **APRIL® - APRIL® 28** si usted tiene hepatitis C y está tomando medicamentos que contienen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dasabuvir glecaprevir/pibrentasvir y sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir, ya que estos medicamentos, pueden producir aumentos en los resultados de pruebas hepáticas (aumento de la enzima hepática ALT).
Su médico le prescribirá otro tipo de anticonceptivo antes de comenzar el tratamiento con estos medicamentos.
APRIL® - APRIL® 28 se puede volver a usar 2 semanas después de la finalización de este tratamiento.
Comunique a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento.
Pruebas analíticas
Si necesita un análisis de sangre, avise a su médico o al personal del laboratorio que está tomando el producto porque los anticonceptivos orales afectan a los resultados de algunas pruebas.
Embarazo, lactancia y fertilidad
Si está embarazada, no debe tomar **APRIL® - APRIL® 28**. Si se queda embarazada mientras toma **APRIL® - APRIL® 28**, debe interrumpir inmediatamente su uso y contactar con su médico.
En general, no se recomienda usar **APRIL® - APRIL® 28** cuando la mujer está dando el pecho. Deberá consultar con su médico si desea tomar anticonceptivos orales mientras está dando el pecho.
Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.
Conducción y uso de máquinas
No existe información que indique que el uso de **APRIL® - APRIL® 28** afecte a la capacidad de conducir o usar máquinas.
Información importante sobre algunos de los componentes de APRIL® - APRIL® 28
APRIL® - APRIL® 28 contienen lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

3. Cómo tomar APRIL® - APRIL® 28
Como tomar APRIL® x 21 comprimidos
Los comprimidos se deben tomar por vía oral en el orden que se indica en el blíster, aproximadamente a la misma hora cada día, con algo de líquido si fuera necesario. Se debe tomar un comprimido cada día durante 21 días consecutivos. Dejar un intervalo de 7 días sin tratamiento y recomenzarlo al octavo día con un nuevo envase, procediendo nuevamente en la forma antes indicada. De esta manera se comenzará cada nuevo envase el mismo día de la semana en que se inició el anterior.
Como tomar APRIL® x 28 comprimidos
Los comprimidos se deben tomar por vía oral en el orden que se indica en el blíster, aproximadamente a la misma hora cada día, con algo de líquido si fuera necesario. Se debe tomar un comprimido cada día durante 28 días consecutivos. Cada envase sucesivo se comenzará a usar al día siguiente de terminar el envase previo. Suele aparecer una hemorragia por privación. Normalmente, el sangrado empieza en 2 o 3 días después de comenzar a tomar los comprimidos inactivos.
Siga la dirección de la flecha que se indica en el blíster, tome primero los comprimidos de color naranja durante 21 días y después, los comprimidos de color blanco durante 7 días, hasta que haya tomado los 28 comprimidos.
Después, deberá empezar a tomar el siguiente blíster. Esto significa que no hay un intervalo sin fármaco entre los envases.
Durante los 7 días de comprimidos blancos debería comenzar el sangrado (normalmente, el 2do o 3er día). Es lo que se conoce como hemorragia por privación y puede continuar cuando comience con el siguiente blíster.
Debe comenzar a tomar el siguiente blíster el mismo día de la semana, y la hemorragia por privación debería aparecer los mismos días cada mes.
Cuándo puede comenzar con el primer blíster
- *Si no ha usado un anticonceptivo hormonal en el mes precedente*
  Comience con **APRIL® - APRIL® 28** el primer día del ciclo (que es el primer día de su menstruación). Si comienza a tomar **APRIL® - APRIL® 28** en el primer día de su menstruación, se está protegiendo inmediatamente frente a un embarazo. También puede comenzar en los días 2-5 del ciclo pero, en ese caso, debe usar medidas extra de protección (p. ej., un condón) durante los primeros 7 días.

- *Cambio desde otro anticonceptivo hormonal combinado o un anillo vaginal o un parche anticonceptivo combinado*
  Puede comenzar a tomar **APRIL® - APRIL® 28** el día siguiente al periodo sin comprimidos del envase que acaba de terminar (o después del último comprimido inactivo de su comprimido precedente).
  Cuando cambie desde un anillo vaginal o un parche anticonceptivo combinado, siga los consejos de su médico.
- *Cambio desde un método que contenga sólo progestágeno (anticonceptivo o inyección de progestágenos, implante o DIU liberadores de progestágenos).*
  Puede cambiar cualquier día desde el comprimido que contiene sólo progestágenos (si usaba un implante o DIU, en el día de su retirada, y si recibía el progestágeno por vía inyectable, en la fecha en la que correspondería la siguiente inyección), pero en todos los casos debe aplicar medidas adicionales de protección (p. ej., un condón) durante los primeros 7 días en los que tome los nuevos comprimidos.
- *Después de un aborto o pérdida fetal.*
  Siga las indicaciones de su médico.
- *Después de tener un hijo.*
  Después de tener un hijo, puede comenzar a tomar **APRIL® - APRIL® 28** entre 21 y 28 días más tarde. Si comienza después del día 28, debe usar un método de barrera (p. ej., un condón) durante los primeros siete días de uso de **APRIL® - APRIL® 28**.
  Si después de tener un hijo ha tenido relaciones antes de comenzar a tomar **APRIL® - APRIL® 28** (de nuevo), primero debe comprobar que no está embarazada o debe esperar hasta su siguiente hemorragia menstrual.
  Pida consejo a su médico si no está segura de cuándo empezar.
- *Si está dando el pecho y desea comenzar a tomar* ***APRIL® - APRIL® 28*** *(de nuevo) después de tener un hijo,* lea la sección sobre "Lactancia".

Si toma más APRIL® - APRIL® 28 del que debe
No hay publicaciones sobre los resultados nocivos de tomar demasiados comprimidos de ***APRIL® - APRIL® 28***. Si toma varios comprimidos de una vez, puede tener síntomas de náuseas y vómitos. Las niñas pequeñas pueden tener hemorragia vaginal.
Si ha tomado demasiados comprimidos de **APRIL® - APRIL® 28**, o si descubre que su hijo se ha tomado algunos, consulte con su médico o farmacéutico.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con el Centro de Toxicología (CIAT), tel. 1722.
Si olvidó tomar APRIL® - APRIL® 28
Si se olvidó de tomar uno de los comprimidos inactivos (blancos), no afectará al efecto de APRIL® 28. Deberá tirar el comprimido inactivo olvidado para no prolongar la semana sin la toma, lo que podría tener un efecto negativo en la efectividad de APRIL® 28.
Si se olvidó de tomar uno de los comprimidos activos, deberá seguir las siguientes instrucciones:
- Si hace **menos de 12 horas** del olvido del comprimido, la protección frente al embarazo no se altera. Todavía podrá tomar el comprimido en cuanto se acuerde y después tome los siguientes comprimidos a la hora habitual.
- Si hace **más de 12 horas** del olvido del comprimido, la protección frente al embarazo puede disminuir. Cuantos más comprimidos se olvide de tomar, mayor es el riesgo de que se reduzca la protección frente al embarazo.

El riesgo de protección incompleta frente al embarazo es mayor si se olvida de tomar un comprimido al comienzo de un blíster o al final de la semana 3.
- **Más de 1 comprimido olvidado del blíster**

Consulte con su médico.
- **Un comprimido olvidado en la semana 1**

Tome el comprimido olvidado en cuanto se acuerde, incluso si ello quiere decir que tiene que tomar dos comprimidos al mismo tiempo. Tome después los comprimidos a la hora habitual y tome **precauciones extra** en los siguientes 7 días, por ejemplo, utilice un condón. Si ha mantenido relaciones sexuales en la semana anterior al descuido, o si se olvidó de comenzar un nuevo blíster después del periodo sin comprimidos, debe darse cuenta de que hay riesgo de embarazo. En ese caso, consulte con su médico.
- **Un comprimido olvidado en la semana 2**

Tome el comprimido olvidado en cuanto se acuerde, incluso si ello quiere decir que tiene que tomar dos comprimidos al mismo tiempo. Tome los comprimidos después a la hora habitual. La protección frente al embarazo no se reduce y no tendrá que tomar precauciones extra.
- **Un comprimido olvidado en la semana 3**

Puede elegir entre 2 posibilidades:
1. Tome el comprimido olvidado en cuanto se acuerde, incluso si ello quiere decir que tiene que tomar dos comprimidos al mismo tiempo.
En lugar de tomar los 7 comprimidos blancos inactivos (caso APRIL® 28) vaya directamente al siguiente blíster. Lo más probable es que tenga una menstruación (hemorragia de privación) pero también puede tener manchado o hemorragia intercurrente cuando tome el segundo blíster.
2. También puede dejar de tomar los comprimidos activos, los de color naranja, y pasar a tomar directamente los 7 comprimidos inactivos de color blanco (caso APRIL® 28) **(anote el día en el que se olvidó de tomar el comprimido)**. Después, continúe con el siguiente blíster.
Si desea comenzar una nueva tira en un día concreto, tome los comprimidos inactivos durante menos de 7 días.
Si sigue una de esas dos recomendaciones, seguirá protegida frente al embarazo.
- Si se olvidó de tomar alguno de los comprimidos de un blíster y no tiene hemorragia en la semana de descanso, podría significar que está embarazada. Debe contactar con su médico antes de continuar con el siguiente blíster.

Qué debe hacer en caso de vómitos o diarrea intensa
Si vomita en las 3-4 primeras horas tras tomar el comprimido activo de color naranja o si tiene diarrea importante, existe el riesgo de que los principios activos del comprimido no se absorban por completo en su cuerpo. La situación es similar a cuando se olvida de tomar un comprimido. Después de vomitar o tener diarrea, debe tomar otro comprimido del blíster de reserva en cuanto sea posible. Si es posible, tómelo *en las 12 horas siguientes* al momento en que tomaría normalmente su comprimido. Si no es posible, o si ya han transcurrido 12 horas, debe seguir el consejo que se incluye en "Si olvidó tomar **APRIL® - APRIL® 28**".

Retraso del periodo menstrual: qué debe saber
Aunque no sea lo recomendado, es posible retrasar su periodo menstrual (hemorragia de privación) hasta el final de un nuevo envase si continúa tomando un nuevo blíster de **APRIL® - APRIL® 28** en lugar de comenzar el periodo de descanso. Puede tener manchado (gotas o motas de sangre) o hemorragia intercurrente mientras usa el segundo blíster. Después de los 7 días de tomar los comprimidos inactivos del segundo blíster (caso APRIL® 28), *continúe con el siguiente blíster.*
Es posible que tenga que pedir consejo a su médico antes de decidir si retrasa su ciclo menstrual.
Cambio del primer día de su periodo menstrual: qué debe saber
Si toma los comprimidos según las instrucciones, su periodo menstrual o hemorragia por privación comenzará en la semana de descanso. Si tiene que cambiar este día, hágalo acortando el periodo de descanso, es decir, comenzando antes un nuevo blíster pero nunca alargándolo. Por ejemplo, si su periodo de descanso comienza en un viernes y desea cambiar a un martes (3 días antes), debe comenzar un nuevo blíster 3 días antes de lo habitual. Si acorta mucho el intervalo de descanso (p. ej., 3 días o menos) es posible que no tenga ninguna hemorragia durante este periodo de descanso. Después, es posible que tenga manchado (gotas o motas de sangre) o hemorragia intercurrente.
Si no está segura de lo que tiene que hacer, pida consejo a su médico.
Si interrumpe el tratamiento con APRIL® - APRIL® 28
Puede dejar de tomar **APRIL® - APRIL® 28** cuando lo desee. Si no desea quedarse embarazada, pida consejo a su médico sobre otros métodos fiables de control de natalidad.
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos, **APRIL® - APRIL® 28** puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.
Informe siempre a su médico si presentara algún efecto secundario, en especial si este efecto secundario es intenso o persistente, o si observa algún cambio en su estado de salud que considere posiblemente debido a los anticonceptivos.
Se describen varios efectos secundarios relacionados con el uso de anticonceptivos orales combinados en las secciones "**APRIL® - APRIL® 28** y trombosis" y "**APRIL® - APRIL® 28** y cáncer". Lea esos párrafos para obtener más información y consulte inmediatamente con su médico, si fuera necesario.
Contacte con un médico de forma inmediata si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas de angioedema: hinchazón de la cara, lengua y/o garganta, y/o dificultad para tragar o urticaria con posible dificultad para respirar.
- Efectos secundarios frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 mujeres): dolor de cabeza, cambios en el estado de ánimo (incluida la depresión), náuseas, dolor abdominal, mamas dolorosas, sensibilidad en las mamas, aumento de peso, erupción cutánea.
- Efectos secundarios poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 mujeres): vómitos, diarrea, retención de líquidos o edema, migraña, pérdida del deseo sexual, aumento del tamaño de las mamas, urticaria.
- Efectos secundarios raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 mujeres): irritación ocular con el uso de lentes de contacto, hipersensibilidad, pérdida de peso, secreción mamaria, flujo vaginal, aumento de la libido, eritema nodoso (nódulos en las piernas), eritema multiforme (lesiones cutáneas).

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, o si cree que así pudiera ser, informe a su médico o farmacéutico.

5. Conservación de APRIL® - APRIL® 28
Conservar a temperatura ambiente entre 15° y 30° C.
Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

Gador
Al cuidado de la vida

32140-006

Elaborado por Gador S.A., Bs. As., Argentina
Importa y representa Laboratorio Gador S.A. N° 259
La Paz 2257 - Montevideo
Tel. 2401 64 44 - Email: uy-info@gador.com
D.T. Quím. Farm. Christian Díaz
Reg. M.S.P. N° 36439 y 42403 - Ley 15443

Classic grupo creativo
Alejandro Gallinal 2325 - Tel. 2525 8802*

23/05/2022