



Venta libre en condiciones reglamentarias
Industria uruguaya

FACTOR A-G® SIMETICONA

FACTOR A-G 40 - FACTOR A-G 200 - FACTOR A-G PEDIÁTRICO

Comprimidos - Solución (gotas)

COMPOSICIÓN

Cada comprimido de FACTOR A-G® 40 mg. contiene:
Simeticona..... 40 mg.
Excipientes..... c.s.
Contiene lactosa.

Cada comprimido de FACTOR A-G® 200 mg. contiene:
Simeticona..... 200 mg.
Excipientes..... c.s.
Contiene sacarina.

Cada ml de FACTOR A-G® pediátrico contiene:
Simeticona..... 40 mg.
Vehículo..... c.s.
Contiene sucralosa.

INDICACIONES

FACTOR A-G® comprimidos está indicado para el alivio sintomático de los gases en adultos y adolescentes a partir de 12 años.
FACTOR A-G® Pediátrico gotas está indicado para el alivio sintomático de los gases en niños y lactantes.

POSOLOGÍA

FACTOR A-G® comprimidos 40 mg:
2 comprimidos 3 veces al día.
FACTOR A-G® comprimidos 200 mg:
1 comprimido 3 a 4 veces al día.
FACTOR A-G® Pediátrico:
Niños mayores de 6 años: 15 a 20 gotas, después de las comidas y antes de dormir, eventualmente con un poco de líquido.
Niños menores de 6 años y lactantes: 10 a 15 gotas, 2 a 3 veces por día en la mamadera, o después de las comidas respectivamente.
No exceder la dosis máxima de 240 mg de simeticona al día.
FORMA DE ADMINISTRACIÓN
Los comprimidos deben ingerirse enteros, sin masticar, con líquido suficiente (agua), durante o después de las comidas principales.
Si los síntomas empeoran o persisten después de 10 días de tratamiento se deberá consultar con el médico para evaluar la situación clínica.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes.
Perforación y obstrucción intestinal conocida o sospechada.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Si los síntomas empeoran, o si persisten después de 10 días, o en caso de estreñimiento prolongado, se deberá evaluar la situación clínica.
Población pediátrica
La simeticona no está recomendada para el tratamiento de los cólicos del lactante debido a la limitada información disponible.
Advertencias sobre excipientes
FACTOR A-G® Pediátrico contiene sucralosa y sorbitol, puede producir caries en los dientes.
FACTOR A-G® comprimidos 40 mg contiene lactosa, los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, deficiencia total de lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.
FACTOR A-G® comprimidos 200 mg contiene sacarina.
Fertilidad, embarazo y lactancia
Embarazo
No hay datos disponibles relativos al uso de este medicamento en embarazadas.
No hay evidencia de perjuicio en embarazadas, debido a la falta de absorción de la simeticona por la madre.
Lactancia
Se desconoce si la simeticona es excretada en la leche materna; no hay suficiente información sobre la excreción de simeticona en la leche materna, ni en animales ni en humanos. No obstante, no se espera que haya excreción debido a la falta de absorción digestiva de la simeticona por la madre.

Dado que la simeticona no se absorbe a través del tracto gastrointestinal, este medicamento puede ser empleado en embarazadas y en mujeres que estén en período de lactancia.

Fertilidad

No se dispone de datos en humanos.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

La influencia de FACTOR A-G® sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas es nula.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN

No se han realizado estudios de interacciones.
La levotiroxina puede unirse a la simeticona. La absorción de levotiroxina puede verse afectada si al mismo tiempo se administra la simeticona en pacientes tratados de trastornos de tiroides, por lo que la administración de preparados con levotiroxina y preparados con simeticona debe separarse al menos 4 horas.

REACCIONES ADVERSAS

Durante el periodo de utilización de simeticona, se han notificado las siguientes reacciones adversas cuya frecuencia no se ha podido establecer con exactitud:
Trastornos gastrointestinales: estreñimiento transitorio moderado y náuseas.
Pueden producirse eructos que constituyen el mecanismo normal de eliminación de los gases con este tratamiento.
Trastornos del sistema inmunológico: reacciones de hipersensibilidad tales como erupción cutánea, picor, edema en la cara o en la lengua o dificultad para respirar.

SOBREDOSIFICACIÓN

No se han notificado casos de sobredosis.
Aún en el caso de que se ingiera una cantidad muy superior a la indicada, es muy poco probable que se produzcan efectos adversos, debido a la falta de absorción por vía oral del medicamento.
En caso de sobredosis accidental o deliberada, el tratamiento es sintomático de los síntomas que pudieran aparecer. No hay procedimiento especial recomendado.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con el Centro de Toxicología (CIAT), tel. 1722.

PRESENTACIONES

FACTOR A-G® 40 mg. Envases conteniendo 20 comprimidos.
FACTOR A-G® 200 mg. Envases conteniendo 10 y 20 comprimidos.
FACTOR A-G® Pediátrico. Frasco gotero con 50 ml.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura ambiente, entre 15 y 30° C, en lugar seco.

NO DEJE MEDICAMENTOS AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



Al cuidado de la vida

Laboratorio Gador S.A. N° 342
La Paz 2257 - Montevideo
Tel. 2401 64 44* - Fax: 2401 18 51
D.T. Quím. Farm. Christian Díaz
Elaborado bajo licencia de Laboratorios CASASCO S.A.I.C. Argentina.
Reg. M.S.P. N° 18499, 27037 y 27097 - Ley 15443



20447
15 mm



15 mm
20447

Nomb. Producto: FACTOR AG®	Presentación: PROSPECTO
Cód. Interno: 320447-002	Pharmacode: 20447
Cód. EAN:	
Sustrato: OBRA 56 - 60 g	
Tintas CMYK:	
Tintas Pantone: 1 Reflex blue C	
Barniz: NO	
Troquel: NO	Formato: En plancha
Aprobación: 18/08/2021	Fto. Ab. 240 x 190 mm

O.T. 3539
Diseño & Fotografía Classic

320447-002